

I.) A fertőzött területre vonatkozóan a szőlő növény, szőlő ültetvény használója (földhasználó/ tulajdonos) az alábbi előírásokat köteles betartani:

1.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről hatóságom engedélye nélkül a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés tüneteit vizuálisan mutató, illetve laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertőzött szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt (erdei iszalagot - *Clematis vitalba*-t) tilos kivinni. A szőlő területről tilos elszállítani szőlő szaporító- és ültetési anyagot, mely kötelezés alól a hatóság a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén kérelemre felmentést adhat. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kijelölt fertőzöttnek minősülő növényeket meg kell semmisíteni! A károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területre csak hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tétélekből szabad telepíteni.

2.) Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor (*Scaphoideus titanus*) ellen kötelező védekezést ír elő 2018. évben, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig. A földhasználók a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal,- a rovarvektor biológiáját figyelembe véve-, kémiai, vagy azzal egyenértékű hatékonyságú védekezést kötelesek folytatni. A zárlati károsító ellen végzett célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást szükséges vezetni (permetezési napló), melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig kötelesek megőrizni!

3.) A fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított és eltávolítandó vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni. 2018. tavasszal, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát!

4.) Rendszeresen ellenőrizni kell a szőlő növényeket és ültetvényeket. Az esetlegesen előforduló zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

5.) A területen szőlőiskola és szőlő törzsültetvény nem létesíthető.

II.) A védő övezetre (puffer zóna) vonatkozóan a szőlő növény, szőlő ültetvény használója (földhasználó/tulajdonos) az alábbi előírásokat köteles betartani:

1.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területről a hatóság engedélye nélkül a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzést vizuálisan mutató, illetve laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertőzött szőlő növényt, szőlő szaporító- és ültetési anyagot, egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (*Clematis vitalba*) kivinni, illetve a károsító terjedését elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szőlő szaporító- és ültetési anyagot a területen csak hatósági növény-egészségügyi ellenőrzésben részesített szőlőiskolákból, forgalmazó helyekről származó tétélekből szabad telepíteni.

2.) Az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor (*Scaphoideus titanus*) ellen kötelező védekezést ír elő 2018. évben, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig. A földhasználók a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal, - a rovarvektor biológiáját figyelembe véve-, kémiai, vagy azzal egyenértékű hatékonyságú védekezést kötelesek folytatni. A zárlati károsító ellen végzett célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást szükséges vezetni (permetezési napló), melyet az utolsó bejegyzéstől számított 3 évig kötelező megőrizni.

3.) A fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolított és eltávolítandó vesszőket égetéssel kell megsemmisíteni. 2018. tavasszal, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszőkön áttelelő tojások számát!

4.) Az esetlegesen előforduló szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell az elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

5.) Nem létesíthető szőlőiskola és szőlő törzsültetvény a zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés szempontjából fertőzött területté minősített területek – fent felsorolt települések – határától számított 100 méter távolságon belül.

III.) Intézkedés körülhatárolt területen található elhanyagolt szőlő területek esetén:

A körülhatárolt területen belül található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szőlő területeket úgy kell tekinteni, hogy a termelő, vagy tulajdonos nem teljesítette a zárlatinak minősülő kórokozó terjedésének megakadályozására és a zárlati károsító terjesztését végző rovarok (rovarvektorok) egyedszámának gyérítésére vonatkozó kötelezettségét.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi az elhanyagolt szőlő területeket, és elrendeli azok művelését/gondozását, és a vektorok elleni kötelező védekezést. (kötelezi a földhasználót, hogy a körülhatárolt területen az esetlegesen előforduló zárlati károsítónak minősülő szőlő aranyszínű sárgaság fertőzés felszámolásáig a növény-egészségügyi zárlati intézkedéseket folyamatosan tartsa be.)

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv azokkal szemben, akik a kötelező védekezést a megadott határidőre nem, vagy nem megfelelő minőségben végzik el, közérdekű védekezést rendel el és a termelő költségére, az ültetvényt/szőlő állományt megsemmisítteti.

A zárlat a fertőzés megszüntetése után, a mentes vizsgálati eredmények birtokában oldható fel.

A növény-egészségügyi zárlati intézkedés külön határozatban került elrendelésre. A határozat hirdetményi úton történő közzétele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88.§ (1) bekezdésének b) pontján alapul, mivel a termelők nagyszámú érintettsége áll fenn, és lakcímük nem áll teljes körűen az eljáró hatóság rendelkezésére.


Tájékoztatom, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv döntése a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályán (7634 Pécs, Kodó dűlő 1.), az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben (H-CS:7:10-15:40; P:7:10-13:10) – előzetes időpont egyeztetés alapján - az ügyfél vagy meghatalmazottja által átvehető.


A szőlő aranszínű sárgaság fitoplazma jelentős károkat okoz a szőlő növényeken, felszámolása mindannyiunk közös érdek, ezért kérnénk a lakosság szíves tájékoztatását a helyben szokásos módon.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Pécs, 2018. február 2.

Dr. Kollár Ferenc járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta:




Dr. Kurucz Sándor
osztályvezető
növény - és talajvédelmi főfelügyelő

Kapják:


1. Keszű Közös Önkormányzati Hivatal, 7668-Keszű, Petőfi Sándor u.24. hk.).
2. Pécs Megyei Önkormányzati Hivatal, 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. (hk.).
3. Szalánta Közös Önkormányzati Hivatal, 7811-Szalánta, Hunyadi u.63. (hk.).
4. Irattár

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
7634 Pécs, Kodó dűlő 1. ☎ 7615 Pécs, Pf.: 13.

☎ +36-72 795-133 📠 +36-72 255-527 ✉ pecs.novenyantalaj@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A BA-04/NT0/00419-3/2018 számú tájékoztatás
elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete

Piros határvonal: 2016 évi körülhatárolt terület
Sárga határvonal: 2017 évi körülhatárolt terület



ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

- Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja